



CAMPANHA DE COMBATE À PRAGA DE ROEDORES

ENTREGA DE RODENTICIDA AOS MUNÍCIPES
DO CONCELHO DE VILA DO PORTO

Vila do Porto
município



O CONTROLO DOS ROEDORES
É DA RESPONSABILIDADE
DE TODOS
E DEPENDE DA ATUAÇÃO
DE TODOS



MONITORIZE

Procure sinais de presença de ratos, quanto mais cedo detetar mais fácil será de controlar.

COMO DETETO A PRESENÇA DE RATOS?

Verifique se nas estações rateiras existem iscos consumidos, pegadas em pó de pista, presença de fezes ou material roído.




DICAS DE ANTI RATIZAÇÃO

- 1.** Acondicione produtos alimentares em estruturas bem fechadas;
- 2.** Mantenha os espaços envolventes bem limpos, livres de entulhos e sem vegetação;
- 3.** Coloque os seus resíduos dentro de contentores fechados;
- 4.** Os comedouros de animais de estimação devem estar limpos, principalmente à noite;
- 5.** Proceda a uma limpeza profunda em zonas de muros de pedra solta, de sebes vegetais, de matas e saídas de esgotos;
- 6.** Tape todos os possíveis pontos de entrada, por exemplo cubra frinchas de portas e coloque rede metálica de malha apertada em aberturas de máquinas de secar; quando observar presença de roedores, não perturbe os seus habitats sem antes proceder a uma desratização;
- 7.** Sempre que identifique situações nas áreas vizinhas que possam levar à reinfestação dos locais tratados, devem criar-se medidas para evitar esse risco.



DICAS DE DESRATIZAÇÃO

- 1.** Contribua para a presença de predadores naturais (por exemplo mochos, milhafres ou doninhas);
- 2.** Opte por predadores domésticos (cães ou gatos);
- 3.** Utilize armadilhas, de forma a evitar acidentes com espécies não visadas;
- 4.** Use aparelhos ultrassom, para repelir os roedores onde não seja possível aplicar outros meios de combate;
- 5.** Use rodenticidas apenas quando confirmada a presença de roedores;
- 6.** Use rodenticida com autorização de venda em Portugal, respeite as indicações do rótulo;
- 7.** Considere o local e as espécies a combater na escolha das substâncias do rodenticida;
- 8.** Recolocar as estações rateiras de zonas inativas para locais de maior atividade;



DICAS DE DESRATIZAÇÃO

9. No caso de confirmação da presença de roedores e de não se verificar consumos no prazo de uma ou duas semanas, deve-se mudar de isco e de possivelmente de estação rateira;
10. Avise os vizinhos da infestação de forma a atuarem em conjunto;
11. O isco disponível, tem de estar preso na estação ou armadilha artesanal de forma a não ser possível o transporte de roenticida para os ninhos;
12. Distribua os iscos nas zonas de passagem dos roedores com uma distância entre estação de 5 a 10 metros (para ratazanas) e de 2 a 4 metros (no caso de murganhos);



DICAS DE DESRATIZAÇÃO

- 13.** A reposição do isco deve ser feita após 48 horas (anticoagulantes de dose múltipla) e até 7 dias no máximo (anticoagulantes de dose única);
- 14.** Não colocar rodenticida junto a cursos de água para evitar perdas ou contaminações;
- 15.** Evite o acesso de crianças e de animais domésticos às áreas onde foram colocados rodenticidas ou armadilhas;
- 16.** Em caso de ingestão acidental de rodenticidas procure imediatamente um médico (ou veterinário em caso de animais) levando informação sobre o produto;
- 17.** Alcançado o controlo, retire os iscos tóxicos, mantenha os iscos não tóxicos, armadilhas ou outros dispositivos de monitorização;
- 18.** Recolha e entregue os resíduos dos rodenticidas e embalagens vazias, num centro de recolha licenciado.

